



Mode et conditions d'utilisation

Les qualités d'efficacité et la souplesse d'utilisation de ALLOWIN® TDS permettent à l'utilisateur de définir et d'appliquer **sa propre stratégie de traitement** en fonction de l'évaluation du risque lié aux ravageurs.

Dans tous les cas, la mise en place de pièges à limaces et leur suivi jusqu'au stade limite de sensibilité de la culture (généralement 4 feuilles) sont très fortement conseillés. En pomme de terre, débiter à partir de la tubérisation.

APPLICATION AVANT SEMIS.....4 à 5 kg/ha

Les applications de présemis peuvent s'envisager dans les parcelles où la pression en limaces est forte et à condition que le ravageur soit présent en surface.

PRECONISATIONS DE BASE

APPLICATION AU SEMIS.....4 à 5 kg/ha

L'application en plein au semis peut être remplacée par une application localisée avec ALLOWIN® "TDS" (4 kg/ha).

APPLICATION ENTRE SEMIS ET LEVÉE 4 à 5 kg/ha

D'une manière générale, les applications au semis doivent être privilégiées car ce sont celles qui protègent le plus efficacement les cultures. Les applications entre le semis et la levée sont réservées aux situations à risque moyen ou bien dans le cadre d'une seconde intervention (pression limace forte). La modulation de dose à 4 kg/ha peut s'envisager dans les traitements en programme, dans les situations à pression modérée et lors d'applications localisées.

RÉINTERVENTION À LA LEVÉE 4 à 5 kg/ha

Les applications à la levée ne peuvent se réaliser que dans le cadre d'un programme ; à ce titre, elles ne doivent jamais constituer le 1^{er} traitement anti-limaces d'une culture.

Délai Avant Récolte : 3 jours. La très bonne persistance d'action de ALLOWIN® TDS doit cependant pousser les utilisateurs à observer un délai plus important dans les cas qui le nécessitent (salade, chou...).



Une nouvelle tenue

- **Plus solide**
- **Plus résistant à l'humidité**
- **Ouverture facile**
- **Moins d'odeurs**
- **Recyclable (Collecte Adivalor)**
- **Informatif (Réglages matériels d'épandage)**
- **Sac certifié** 



DE SANGOSSE



SERVICE CLIENT
N°Azur 0 810 82 22 82
PRIX APPEL LOCAL

Bonnell - BP 5 - 47480 PONT DU CASSE - TÉL. 05 53 69 36 30 - FAX 05 53 66 30 65 - www.desangosse.fr

ALLOWIN®. AMM : N°2000136. Composition : Métaldéhyde à 50 g/kg. Usages autorisés, mode d'emploi et doses : se référer à la notice et à l'étiquette. Marques déposées, homologations et fabrication : METAREX S.A. Lire attentivement les étiquettes avant toute utilisation et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi.


PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

P R O T E C T I O N D E S P L A N T U L E S

NOUVEL ANTI-LIMACES


ALLOWIN® TDS

Diabolique !



DE SANGOSSE

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI



ALLOWIN® TDS

**Nouvelle formulation
pour une meilleure protection de vos plantules...**




Ses bénéfices



Attractivité unique

- ▶ 40 % plus attractif que ALLOWIN®.

Attractivité du granulé ALLOWIN® TDS sur limaces noires par rapport aux plantules



**Plus attractif
que les
plantules !**

Source : R&D DE SANGOSSE 2008

- ▶ Pas de découverte aléatoire du granulé.



Longue persistance d'action

- ▶ L'assurance efficacité dans le temps.




**Plus résistant
même en conditions
difficiles**



Appétence accrue

- ▶ Ingestion systématique de la dose létale.

Consommation de différents appâts sur limaces noires (sans matière active)




**30 % plus
appétant**

Source : R&D DE SANGOSSE 2007

**Appât TDS
LA référence
efficacité du
marché !**



Pourquoi choisir ALLOWIN® TDS ?




**Plus efficace
avec moins de
matière active
par hectare**

Source : DE SANGOSSE 2008



Epannage facile et régulier

- ▶ Granulé cylindrique sans poussière.
- ▶ Densité : 0,8.



**C.V.*
11,68 %**

*Coefficient de variation.

En plein et en traitements localisés

- ▶ 75 000 granulés/kg.
- ▶ 4 à 5 kg/ha.



**75 000
granulés/kg**

